

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će obezbijediti sredstva za nabavku injekcija "clexan" i "clivarin" za trudnice.



Program lijekova koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove za 2020. godinu.

Zavod zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona




Institute for health insurance
of Tuzla canton

info@zzotk.ba
www.zzotk.ba

Ako imate bilo kakvih pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, možete kontaktirati na sljedeće telefone u svim Poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

BANOVIĆI	035 871-045
ČELIĆ	035 660-457
DOBOJ ISTOK	035 723-493
GRADAČAC	035 817-119
GRAČANICA	035 700-412
KALESIJA	035 631-030
KLADANJ	035 621-206
LUKAVAC	035 550-130
SREBRENİK	035 645-818
SAPNA	035 597-420
TEOČAK	035 755-930
TUZLA	035 300-600 035 251-122 035 251-124
ŽIVINICE	035 774-676

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
TUZLANSKOG KANTONA



**Pravo na terapiju
niskomolekularnim
heparinom**

/Clivarin i Clexane/

FINANSIJSKA SREDSTVA

U skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona predviđena su sredstva za nabavku niskomolekularnih heparina za trudnice.

INDIKACIJE I DOKUMENTACIJA UTVRĐENE DOKTRINARNIM PRISTUPOM

Ministarsvo zdravstva Tuzlanskog kantona izradilo je Doktrinarni pristup kojim su predviđene indikacije i medicinska dokumentacija na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju pravo na nabavku niskomolekularnih heparina (Clivarin i Clexane).

*Sistemska lupus erythematosus

*Antiphospholipid sindrom

*Trombofilija

Antiphospholipid sindrom (cirkulirajući antikoagulant, antikardiolipinska antitijela, anti-b2GP1).

sistemska lupus erythematosus (antinuklearni faktor).



Trombofilija/Urođene trombofilije:

- aktivnost antitrombina III (0.8-1.2 IU/ml), Proteina C (0.7-1.4 IU/ml, Proteina S (0.7-1.0 IU/ml).

- određivanje rezistencije na aktivirani protein C odnos (>2.5), mutacije FV Leiden, FII G20210A, inhibitora aktivatora plazminogena PA-1.

Stečene trombofilije:

- LAC, anti beta 2 glikoproteinski antitijela (IgG i IgM) i antikardiolipinskih antitijela (IgG i IgM).

PREPORUKE ZA PRIMJENU

- Za trombofilije niskog rizika bez prethodne VTE/praćenje trudnoće bez antikoagulantne terapije.
- Za trombofilije niskog rizika sa jednom prethodnom epizodom VTE koje nisu na dugotrajnoj terapiji – profilaktička ili srednja doza LMWH ili nadzor bez terapije.
- Za trombofilije visokog rizika bez prethodne VTE – profilaktička primjena LMWH ili nefrakcionarnog heparina antepartalno i post partalno.
- Kod trombofilija visokog rizika sa prethodnom epizodom VTE-antikoagulantna terapija tokom čitave trudnoće.
- Kod trombofilija visokog rizika sa prethodnom epizodom VTE-antikoagulantna terapija tokom čitave trudnoće.

- Trudnice sa prethodnom epizodom VTE, a bez trombofilije treba pratiti bez antikoagulantne terapije prije o postpartalno.



VAŽNO

Osigurana lica (trudnice) imaju pravo na lijek (niskomolekularni heparin) u skladu sa indikacijama, bez obzira na hospitalizaciju.

Nabavka i preuzimanje lijekova (Clexan i Clivarin) vršit će se samo u bolničkoj apoteci JZU UKC Tuzla.

Pravo se ostvaruje na osnovu nalaza ljekara specijaliste ginekologa iz perinatološke ambulante i/ili otpusnog pisma i Konzilijarnog mišljenja Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

Za aplikaciju niskomolekularnih heparina nije potreban nadzor medicinskog osoblja JZU UKC Tuzla.