



TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

TUZLA CANTON

MINISTRY OF HEALTH

Broj: 13/1-33-36050-7/24
Tuzla, 31.07.2025. godine

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kanta.

01-33-4-1070-1/25

**ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
TUZLANSKOG KANTONA**

**JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA**

PREDMET: Doktrinarni pristup za Sirolimus, dostavlja se


Poštovani,

U prilogu vam dostavljamo Izmjenjenji doktrinarni pristup za lijek Sirolimus.

S poštovanjem,

Dostaviti:

- 1x ZZO TK
- 1x JZU UKC Tuzla
- 1x a/a



MINISTAR

Dužanka Bećirović
Prim. dr. Dužanka Bećirović

OPERATIVNI PROGRAM

Sirolimus

ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime lijeka i djelovanje	Oblik i jačina lijeka	Način propisivanja lijeka	Evalucija efikasnosti terapije	Predviđeni broj pacijenata u 2025. godini
L04AA10	Sirolimus	Oralna otopina (1 mg/ml) obložene tablete 0,5 mg; 1 mg	SZU (Stacionarne zdravstvene ustanove)	Jednom godišnje	2

Doktrinarni pristup

Indikacije:

- Komplikovani veliki cistični limfangiomi
- Limfangiroleomiomatoza

Medicinska dokumentacija:

- Mišljenje ljekara specijaliste ili konzilija sa dijagnozom i preporučenom terapijom.
- Nema potrebe za hospitalizacijom, osim ako nije indicirana iz drugih razloga.

Oblik i način aplikacije lijeka:

- Lijek je namjenjen za pacijente u kućnom tretmanu komplikovanog velikog cističnog limfangioma i/ili limfangiroleomiomazote, te se uzima peroralno.

Terapija i terapijska doza:

- Doza lijeka je 0,5 mg/m² površine tijela, te se kao "loading doza" propisuje 2 puta dnevno 10 dana.
- Doza održavanja lijeka se daje jednom dnevno.

Trajanje terapije:

- Do značajne redukcije komplikovanog velikog cističnog limfangioma i/ili limfangiroleomiomazote, ili po procjeni nadležnog konzilija.

Evaluacija efikasnosti terapije:

- Vršiti se prilikom svakog specijalističkog pregleda, prva kontrola nivoa Sirolimusa u serumu 7 dana nakon uvođenja u terapiju, zatim kontrola nivoa 1 mjesečno uz evaluaciju nalaza KS, CRP, SE, TBI, AST, ALT, urea, kreatinin, K, Ca, Na, fosfor, Mg, proteinogram, lipidogram, urin.
- Kontrola UZ abdomena 1 mjesečno, prvi MRI abdomena 3 mjeseca nakon uvođenja terapije, sljedeći kroz 6 mjeseci.
- Evaluacija toka bolesti vrši se jednom godišnje i dostavlja se ZZO TK.